



SIGNES D'IMMINENCE :

ENVIE IRREPRESSIBLE DE POUSSER,
TÊTE À LA VULVE,
CONTRACTIONS SANS REPÊT

TV :

POSITION :

AVANT-BRAS SOUS LES LOMBES,
UNE CUISSE HYPER-FLECHIE SUR LE PERINEE,
OPERATEUR EN FACE, HYGIENE +++
DOIGTS GANTES EN AVT ET EN HAUT



RESULTAT :

SI DILATATION > 4 CM, REFAIRE 10 MINUTES APRES POUR SUIVRE L'EVOLUTION

APPEL AU 15 : Bilan et décision (Transport ou accouchement)

INSTALLATION :



Lutter contre l'infection :

PERINEE NETTOYEE AU DAKIN,
TV + ACCOUCHEMENT AVEC GANTS STERILES, HABILLAGE DES
INTERVENANTS, CHAMPS STERILES, CLAMPS STERILES (UU) ET CISEAUX
STERILES, DESINFECTION CORDON.

Température Nouveau-né > 36°C :

PRECHAUFFAGE PIECE ET AMBULANCE, PAS DE COURANT D' AIR,
SECHAGE, BONNET, PEAU A PEAU AVEC SA MERE, COUVERTURE,
SURVEILLANCE VENTILATION, COLORATION, TEMPERATURE.

DEXTRO (à ne pas faire si BB
va bien) : si < 0.3 g/l = signe
de refroidissement

**Tant que le cordon n'est clampé, le bébé doit
rester au même niveau que la maman**

Délivrance :

URINER AVANT ACCT OU APRES EXPULSION, POSE VVP, 5UI SYNTOCINON IV OU IM DANS
LA MINUTE QUI SUIV L'EXPULSION, MASSAGE DU FOND UTERIN, RECUEIL DU PLACENTA ET
EXAMEN, SURVEILLANCE PARAMETRE VITAUX
AU MOINDRE DOUTE : APPEL 15 POUR PREPARATION ACCUEIL : CHOIX DU CENTRE, REA,
CULOT GLOBULAIRE A L'ARRIVEE.